

Cas particulier : Conseil quand la personne est réticente.

En cas d'impossibilité de brossage, un soin de bouche est réalisé par défaut après décision concertée entre le chirurgien-dentiste, l'équipe médicale et la famille.

Matériel

- 1 - Se laver les mains ou les désinfecter à l'aide d'une solution hydro-alcoolique, mettre des gants.
- 2 - Préparer le matériel nécessaire :



- Eau ou sérum physiologique, ou bain de bouche en cas de prescription médicale



- Gants à usage unique et compresses



Technique


- 3 - Installer confortablement la personne, la prévenir et lui expliquer les gestes avec des mots simples.



- 4 - L'aidant familial commencera par :
 - Faire boire un peu d'eau ou humecter les lèvres.
 - Lubrifier les lèvres si elles sont sèches (en cas d'oxygénothérapie, n'utiliser que des produits à base d'eau).

5 - Tremper une compresse dans le gobelet

6 - Essorer la compresse et l'enrouler autour de l'index. Nettoyer la cavité buccale d'arrière en avant, en commençant par la mâchoire supérieure puis la mâchoire inférieure.



Passer la compresse sur toutes les faces des dents et les gencives, sur la face interne des joues, sur la langue et sur le palais en prenant soin de ne pas aller trop au fond pour ne pas déclencher un réflexe nauséux.
Changer de compresses fréquemment en faisant des pauses.

**Arrêter le soin de bouche
lorsque la dernière compresse utilisée est propre.**

Ne pas insister si la personne interpose les mains, ou cherche à mordre et réessayer à un autre moment de la journée.

Fréquence

Après chaque repas ou au moins deux fois par jour

**ESSAYER DE REPRENDRE LE BROSSAGE DENTAIRE
DÈS QUE POSSIBLE.**



SOHDEV - Centre Hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel - BP 300 39 - 69 678 BRON CEDEX
www.sohdev.org
04.37.91.54.14